

KALENDARZ SZCZEPIEŃ

Sprache: Polnisch

SZCZEPIENIE WIEK

Szczepienia powinny być przeprowadzane w jak najwcześniejszym terminie.
Sprawdzenie statusu szczepień jest pożyteczne w każdym wieku. Brakujące szczepienia powinny być nadrabiane bezzwłocznie, zgodnie z zaleceniami dla danego wieku.

Zalecenia Komisji Stałej ds. Szczepień (STIKO), 2022. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



	w tygodniach		w miesiącach							w latach							Terminy najbliższych szczepień				
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17		od 18	od 60		
	U4		U5			U6				U7		U7a/U8		U9		U10		U11/11		J2	
Rotawirusy	G1 ^a		G2	(G3)																	
Tęžec ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c				N			A1	N	A2	N		A ^e				
Błonica ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c				N			A1	N	A2	N		A ^e				
Krzusiec ^b Koklusz	G1	N	G2	N	G3 ^c				N			A1	N	A2	N		A3 ^e	N			
HIB ^b Haemophilus influenzae typu B	G1	N	G2	N	G3 ^c				N												
Choroba Heinego-Medina ^b Polio	G1	N	G2	N	G3 ^c					N				A1			N				
Wirusowe zapalenie wątroby typu B	G1	N	G2	N	G3 ^c						N										
Pneumokoki ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c				N												S ^g
Meningokoki typu C								G1						N							
Odra					G1	N		G2					N								S ^f
Świnka, Różyczka					G1	N		G2					N								
Ospa wietrzna Varicella					G1	N		G2					N								
HPV Wirus brodawczaka ludzkiego														G1 ^d G2 ^d	N						
Półośpic																					G1 ^h G2 ^h
Grypa Grypa																					S (co roku)



OBJAŚNIENIA

- G** UODPORNIENIE PODSTAWOWE (w postaci do 3 szczepionek zęściowych G1 – G3)
- S** SZCZEPIENIE STANDARDOWE
- A** SZCZEPIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
- N** SZCZEPIENIE NADRABIAJĄCE (Uodpornienie wszystkich osób jeszcze nie zaszczepionych lub uzupełnienie niedokończonej serii szczepień)
- U** Badanie pozwalające na wczesne rozpoznanie
- J** Badanie młodzieży (J1 w wieku 12–14 lat)

- a** Pierwsza dawka szczepionki powinna zostać podana już w wieku 6 tygodni, w zależności od zastosowanej szczepionki 2-ga lub 3-cia dawka w odstępach minimum 4 tygodni.
- b** Wcześnieiki: dodatkowa dawka szczepionki w wieku 3 miesięcy, tj. łącznie 4 dawki szczepionki. Mindestc.
- c** Minimalny odstęp czasowy od poprzedniej dawki: 6 miesięcy.
- d** Dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 5 miesięcy. W przypadku szczepienia nadrabiającego, rozpoczynającego się w wieku ≥ 15 lat lub w przypadku odstępów czasowych szczepienia < 5 miesięcy, pomiędzy 1-szą a 2-gą dawką wymagana jest 3-cia dawka.
- e** Td – szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowana, co 10 lat. Następne przypadające jednorazowe szczepienie Td w postaci szczepionki Tdap lub, jeżeli jest to wskazane, jako szczepienie skojarzone Tdap-IPV.

- f** Jednorazowe szczepienie szczepionką MMR dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 w wieku ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, które nie były szczepione lub były szczepione tylko raz w okresie dzieciństwa.
 - g** Szczepienie 23-walentną szczepionką polisacharydową.
 - h** Dwukrotne szczepienie inaktywowaną szczepionką z adiuwantem przeciwko półpaścowi w odstępach od co najmniej 2 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy.
- * Szczepienia mogą być rozłożone na kilka terminów szczepień. Szczepionki MMR i V mogą być podawane w tym samym terminie lub w czterotygodniowych odstępach.